

ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาเอชไอวีของสำนักงานการแพทย์ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)

				เป้าประสงค์		
วิสัยทัศน์ (VISION)	ไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่	ไม่มีการตายเนื่องจากเอดส์	ไม่มีการตีตราและเลือกปฏิบัติ			
มุ่งสู่เป้าหมายที่เป็นศูนย์ (Getting to Zero)	<ul style="list-style-type: none"> ● จำนวนผู้ติดเชื้อฯ รายใหม่ลดลง ๒/๓ จากที่คาดประมาณ ● อัตราการติดเชื้อฯ เมื่อแรกเกิด < ร้อยละ ๑ 	<ul style="list-style-type: none"> ● ร้อยละ ๘๐ ของผู้ติดเชื้อฯ และผู้ช่วยเอดส์ เข้าถึง ART ● ร้อยละ ๘๐ ของผู้ติดเชื้อฯ และครอบครัว ที่ได้รับผลกระทบได้รับความคุ้มครองทางสังคม และเข้าถึงการดูแลสุขภาพช่วยเหลือที่มีคุณภาพ ● จำนวนผู้ติดเชื้อฯ เสียชีวิต เนื่องจากวัณโรค ลดลงมากกว่าร้อยละ ๕๐ 	<ul style="list-style-type: none"> ● ร้อยละ ๘๐ ของผู้ติดเชื้อฯ และผู้รับผลกระทบ รายงานว่าไม่ถูกตีตราและเลือกปฏิบัติตนเอง 	<ul style="list-style-type: none"> ● ร้อยละ ๘๐ ของผู้ติดเชื้อฯ และผู้รับผลกระทบ จากชุมชนและผู้ให้บริการ 		

สถานการณ์โรคเอดส์กรุงเทพมหานคร

ปีงบประมาณ.	ผู้ป่วยเอดส์รายใหม่	เสียชีวิต	ผู้ป่วยเอดส์สะสม
๒๕๒๗-๒๕๔๘	๓๐,๘๗๖	๗,๙๕๔	
๒๕๔๙	๓,๖๙๐	๔๘๓	
๒๕๕๐	๒,๒๘๘	๓๓๐	
๒๕๕๑	๒,๑๒๗	๒๓๖	
๒๕๕๒	๑,๕๓๑	๑๙๒	
๒๕๕๓	๑,๔๓๖	๑๗๓	
๒๕๕๔	๙๘๕	๑๔๑	
	๔๒,๙๓๓	๙,๕๐๙	๓๓,๔๒๔

ร้อยละของผู้ป่วยเอดส์ในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ.๒๕๒๗ - กันยายน ๒๕๕๔

จำแนกตามอาชีพ	
อาชีพ	ร้อยละ
รับจ้างทั่วไป	๔๐.๐๑
ว่างงาน	๑๓.๔๓
งานบ้าน	๘.๕๙
ผู้ต้องขัง	๗.๙๓
อื่นๆ	๖.๐๗
ค้าขาย	๖.๐๒
ไม่ระบุอาชีพ	๕.๒๓
พนักงาน/ลูกจ้างบริษัท	๔.๘๘
ข้าราชการ/พลเรือน	๓.๗๗
เด็กต่ำกว่าวัยเรียน	๒.๘๓
กรรมกร/ผู้ใช้แรงงาน	๑.๒๔

จำแนกตามปัจจัยเสี่ยง	
ปัจจัยเสี่ยง	ร้อยละ
เพศสัมพันธ์	๗๙.๓๕
ยาเสพติดชนิดฉีดเข้าเส้น	๙.๙๕
ไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง	๗.๓๕
ติดเชื้อจากมารดา	๓.๓๔
รับเลือด	๐.๐๒

จำแนกตามโรคติดเชื้อฉวยโอกาส

โรคติดเชื้อฉวยโอกาส	ร้อยละ
วัณโรคปอด	๔๐.๓๐
โรคปอดบวม	๑๖.๗๓
เยื่อหุ้มสมองอักเสบ	๑๐.๔๗
เชื้อราของหลอดเดินอาหาร	๕.๐๒
แบคทีเรียมากกว่า ๑ ครั้ง/ปี	๔.๐๖
เชื้อฉวยโอกาสอื่นๆ	๒๓.๔๒

จำนวนผู้ป่วยเอดส์ในกรุงเทพมหานคร จำแนกตามเพศและกลุ่มอายุ พ.ศ.๒๕๒๗ - กันยายน ๒๕๕๔

ช่วงอายุ	ชาย	หญิง	รวมจำนวน	ร้อยละ
อายุ ๐-๔ ปี	๕๗๔	๕๐๒	๑,๐๗๖	๒.๕๑
อายุ ๕-๙ ปี	๑๕๐	๑๓๑	๒๘๑	๐.๖๕
อายุ ๑๐-๑๔	๔๗	๖๔	๑๑๑	๐.๒๖
อายุ ๑๕-๑๙ ปี	๑๗๑	๑๖๑	๓๓๒	๐.๗๗
อายุ ๒๐-๒๔ ปี	๑,๗๗๖	๑,๐๓๖	๒,๘๑๒	๖.๕๕
อายุ ๒๕-๒๙ ปี	๕,๕๙๗	๒,๕๘๙	๘,๑๘๖	๑๙.๐๗
อายุ ๓๐-๓๔ ปี	๗,๕๐๑	๒,๕๑๓	๑๐,๐๑๔	๒๓.๓๒
อายุ ๓๕-๓๙ ปี	๖,๓๓๕	๑,๙๐๐	๘,๒๓๕	๑๙.๑๘
อายุ ๔๐-๔๔ ปี	๔,๑๕๒	๑,๒๖๑	๕,๔๑๓	๑๒.๖๑
อายุ ๔๕-๔๙ ปี	๒,๔๓๖	๗๔๙	๓,๑๘๕	๗.๔๒
อายุ ๕๐-๕๔ ปี	๑,๒๓๓	๓๗๖	๑,๖๐๙	๓.๗๕
อายุ ๕๕-๕๙ ปี	๕๘๘	๒๑๕	๘๐๓	๑.๘๗
อายุ ๖๐ ปี ขึ้นไป	๖๙๖	๑๘๐	๘๗๖	๒.๐๔
รวมทั้งสิ้น			๔๒,๙๓๓	๑๐๐.๐๐

คาดประมาณการติดเชื้อเอชไอวีประเทศไทย (๒๐๑๐ - ๒๐๑๕)

Year	New HIV in year	New HIV in year เฉลี่ยต่อวัน	Cumulative HIV in year	Living with HIV end year
๒๐๑๐	๑๐,๘๕๓	๓๐	๑,๑๓๘,๐๒๐	๔๙๙,๓๒๔
๒๐๑๑	๑๐,๐๙๗	๒๘	๑,๑๔๘,๑๑๗	๔๘๑,๗๗๐
๒๐๑๒	๙,๔๗๓	๒๖	๑,๑๕๗,๕๘๙	๔๖๔,๔๑๔
๒๐๑๓	๘,๙๕๙	๒๕	๑,๑๖๖,๕๔๘	๔๔๗,๖๔๐
๒๐๑๔	๘,๕๓๕	๒๓	๑,๑๗๕,๐๘๔	๔๓๑,๔๗๕
๒๐๑๕	๘,๑๘๔	๒๒	๑,๑๘๓,๒๖๘	๔๑๖,๐๙๙