

ผลงานประกบการพิจารณาประเมินบุคคล
เพื่อแต่งตั้งดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์
ตำแหน่งประเภททั่วไป

ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ๖๙ (ด้านการพยาบาลวิสัญญี)

เรื่องที่เสนอให้ประเมิน

1. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

เรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยแท้งไม่สมบูรณ์ที่มารับบริการระงับความรู้สึกแบบผู้ป่วยนอก
เพื่อยุดดมดูด

2. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

เรื่อง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้การระงับความรู้สึกแบบผู้ป่วยนอกของ
วิสัญญีพยาบาล โรงพยาบาลตากลัน

เสนอโดย

นางสาวสุภากรณ์ พาจวงศ์

ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ๕

(ตำแหน่งเลขที่ รพต.169)

ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลตากลัน

สำนักการแพทย์

ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

1. ชื่อผลงาน การพยาบาลผู้ป่วยแท้งไม่สมบูรณ์ที่มารับบริการระงับความรู้สึกแบบผู้ป่วยนอกเพื่อบรุณดลูก
2. ระยะเวลาที่ดำเนินการ 3 เดือน (วันที่ 14 เดือนกันยายน พ.ศ. 2549 – วันที่ 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2549)
3. ความรู้ทางวิชาการหรือแนวคิดในการดำเนินการ

3.1 ความรู้ทางวิชาการ

ภาวะแท้ง

ภาวะแท้ง หมายถึง การสื้นสุดของการตั้งครรภ์ก่อนอายุครรภ์ครบ 20 สัปดาห์ รวมทั้งทารกตามคลอดแต่หากมีชีวิตที่มีน้ำหนักน้อยกว่า 500 กรัมซึ่งมีหลายชนิดได้แก่ ภาวะแท้งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ภาวะแท้งครบ ภาวะแท้งค้าง ภาวะแท้งเป็นอาจิณ และภาวะแท้งไม่สมบูรณ์ เป็นต้น

ภาวะแท้งไม่สมบูรณ์ คือ การที่ผลผลิตของการตั้งครรภ์แท้งออกมากบางส่วนก่อนอายุครรภ์ 20 สัปดาห์

สาเหตุของภาวะแท้ง มีหลายสาเหตุแต่สาเหตุที่พบบ่อยเกิดจากการตั้งครรภ์ที่มีความผิดปกติของโครโนซอม การสร้างตัวอ่อน ความผิดปกติของอวัยวะสืบพันธุ์ ออร์โนนและเมตาบอลิซึมของมารดา เช่น มารดาเป็นโรคเบาหวาน โรคชั้ยรอยด์ โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง มีภาวะทุพโภชนาการ ได้รับสารที่เป็นอันตรายต่อทารก การบาดเจ็บทางหน้าท้อง โดยตรง และความผิดปกติของมดลูกหรือปากมดลูก

อาการและการแสดง มีเลือดออกทางช่องคลอด อาจมีชิ้นส่วนของรกรหรือก้อนเลือดออกมาด้วย มีอาการปวดเกร็งบริเวณท้องน้อยเหนือหัวเหง้าตราชากในพบว่ามีเลือดออกจากโพรงมดลูก คลำได้ชิ้นส่วนของรกรูกอยู่ที่ปากมดลูก

การรักษาภาวะแท้ง ต้องขัดเนื้อเยื่อที่ตอกค้างอยู่ในโพรงมดลูกออกให้หมด มิฉะนั้นผู้ป่วยจะตกเดือด การให้ยากระตุ้นการหดรัดตัวของมดลูกผสมในสารน้ำ helyd ให้ทางหลอดเลือดดำจะช่วยลดการเสียเลือด ช่วยขับเนื้อเยื่อและลดการเกิดมดลูกทะลุในขณะบุณดลูกได้ด้วย

สำหรับผู้ป่วยกรณีศึกษาได้รับการวินิจฉัยว่ามีภาวะแท้งไม่สมบูรณ์ จึงมีแผนการรักษาโดยการบุณดลูก และให้การระงับความรู้สึกแบบผู้ป่วยนอกเพื่อบรุณดลูกโดยวิธีระงับความรู้สึกผ่านทางหน้ากากช่วยหายใจ

3.2 ความรู้เรื่องการให้ยาระงับความรู้สึกแบบผู้ป่วยนอก

การให้การระงับความรู้สึกแบบผู้ป่วยนอกมีปัจจัยที่ควรคำนึงถึงคือ สภาพของผู้ป่วย โดยที่ผู้ป่วยควรมีสุขภาพที่สมบูรณ์ หรือมีโรคประจำตัวที่ไม่รุนแรง มีผลการตรวจร่างกายและผลตรวจทางห้องปฏิบัติการที่แสดงให้เห็นว่าภาวะของโรคคงที่หรือไม่ lever ร้ายไปกว่าเดิมในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา ลักษณะและชนิดของการผ่าตัด ไม่ซับซ้อน ควรมีการเตรียมความพร้อมทางด้านต่างๆ ดังนี้

