



ประกาศสำนักการแพทย์  
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ อนุมัติ  
หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลและการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ  
ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้นำ  
หลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป)  
และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ สำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่  
๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ซึ่งได้กำหนดให้หน่วยงานพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้  
ดำรงตำแหน่งตามที่ ก.ก. ได้กำหนดตำแหน่งไว้แล้วในอัตราส่วน ๑ ราย ต่อ ๑ ตำแหน่ง มาใช้กับการประเมินบุคคล  
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ

สำนักการแพทย์ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก  
พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นแล้ว ปรากฏว่า  
มีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับ การคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ
๑	นางสาวสายสุดา ยังเสนกุ	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพท. ๒๑๙)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพท. ๒๑๙)	กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลหลวงพ่อทวดศักดิ์ ชุตินรโร อุทิศ สำนักการแพทย์

ประกาศ ณ วันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

นายสมชาย (จึงเมฆะ)

รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์  
ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการแพทย์

### สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นางสาวสายสุดา ยังเสนญ

เพื่อประเมินบุคคลในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพท. ๒๑๔)

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
<b>๑. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล</b>	
๑.๑ คุณวุฒิการศึกษา	- พยาบาลศาสตรบัณฑิต
๑.๒ ประวัติการรับราชการ	- อายุราชการ ๗ ปี ๓ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘)
๑.๓ มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือได้รับการยกเว้นจาก ก.ก. แล้ว	- ดำรงตำแหน่งระดับ๔ หรือเทียบเท่าเป็นเวลา ๕ ปี ๓ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘)
๑.๔ มีระยะเวลาขั้นต่อในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะคัดเลือก	- ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการหรือเทียบเท่าเป็นเวลา ๗ ปี ๓ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘)
๑.๕ มีใบอนุญาตประกอบอาชีพ (ถ้ามี)	- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการดูแลรักษา ขั้นหนึ่ง ใบอนุญาตที่ ๔๖๑๖๐๘๕๐๓๓
<b>๒. การพิจารณาคุณลักษณะของบุคคล</b>	
- ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชาประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	- ได้คะแนนประเมิน ร้อยละ ๘๗
<b>๓. อื่นๆ</b>	
(ระบุ).....	
.....	

## เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางสาวสายสุดา ยังเสนกู

ตำแหน่งที่จะขอรับการประเมิน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพท. ๒๑๙)

### ๑. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน การพยาบาลผู้คลอดที่มีภาวะถุงน้ำคร่าແtag ก่อนการเจ็บครรภ์และได้รับยากระตุ้น การหดรัดตัวของมดลูก

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน ๕ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ ถึง ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๘)

ขณะดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินธโร อุทิศ สำนักการแพทย์

กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด

กรณีดำเนินการร่วมกับแพทย์คน รายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน ผลสำเร็จของงาน (ระบุความสำเร็จเป็นผลผลิต หรือผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับ)

กรณีศึกษา ผู้คลอดหญิงไทย อายุ ๓๕ ปี อาชีพรับจ้าง เชื้อชาติไทย สัญชาติไทย ตั้งครรภ์ที่ ๓ อายุครรภ์ ๓๙ สัปดาห์ ๕ วัน เคยแท้ง ๑ ครั้ง ไม่ได้รับการขูดมดลูก ปฏิเสธการแพ้ยาและอาหาร ไม่เคยได้รับการผ่าตัดใด ๆ บุคลในครอบครัวแข็งแรงดี ไม่มีโรคถ่ายทอดทางพันธุกรรม ฝากครรภ์ที่โรงพยาบาล หลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินธโร อุทิศ อย่างต่อเนื่อง จำนวน ๑๒ ครั้ง วันแรกของการมีประจำเดือนครั้งสุดท้าย (Last Menstruation Period , LMP) วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๗ คาดคะเนกำหนดคลอด (Experiode Date of Confirement , EDC) วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการการตรวจซิฟิลิส (VDRL) ได้ผลลบ ไวรัสตับอักเสบบี (HBs Ag) ได้ผลลบ ไวรัสเออดส์ (Anti HIV) ได้ผลลบความเข้มข้นของ เม็ดเลือดแดง (Hct) ครั้งที่ ๑ ร้อยละ ๓๒.๒ ครั้งที่ ๒ ร้อยละ ๓๔ หมู่เลือด (Blood group) เอ อาร์เอช ชนิดบวก (Rh positive)

วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ รับไว้ในการดูแลเวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา อาการสำคัญที่นำมาโรงพยาบาล เนื่องจาก ๑ ชั่วโมง ก่อนมาโรงพยาบาลมีน้ำเหลืองจากทางช่องคลอดโดยไม่มีอาการเจ็บครรภ์ ไม่มีมูกเลือด ทารกในครรภ์ดีนี้ ตรวจทางหน้าท้องระดับยอดคลูก ¾ มากกว่าระดับสะตือ ตรวจภายในพบปากมดลูก เปิด ๓ เซนติเมตร ความบางปากมดลูกร้อยละ ๕๐ ระดับส่วนนำ-๑ ส่วนนำเป็นศีรษะไม่พบถุงน้ำคร่าจาก การสังเกตมีน้ำลักษณะใส่หลอกทางช่องคลอด ทดสอบด้วยกระดาษไนตรัซีน (Nitrazine Test) พบร้า กระดาษไนตรัซีนเปลี่ยนสีเป็นสีน้ำเงินอมเขียวเทียบค่าความเป็นกรด - ด่างเท่ากับ ๗ แสดงว่าเป็นน้ำคร่าจริง มดลูกมีการหดรัดตัวทุก ๑๒ นาที นาน ๓๐ วินาที ความรุนแรงของการหดรัดตัวของมดลูก + ๑ อัตราการเต้น ของหัวใจทารกในครรภ์ ๑๗๘ ครั้งต่อนาที การตรวจร่างกายเบื้องต้นพบรอบต่างๆ ปกติ ให้การพยาบาล โดยฝ่ายสังเกตอาการดูแลผู้คลอดนอนพกบนเตียง ห้ามไม่ให้ลูกเดินเพื่อป้องกันสายสะตือย้อย (prolapsed cord) และชักนำการคลอดโดยให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ ๕% Dextrose in ½ Normal Saline Solution ปริมาณ ๑,๐๐๐ มิลลิลิตร ผสมยากระตุ้นการหดรัดตัวของมดลูก Syntocinon ปริมาณ ๑๐ ยูนิต หยดต่อนาที เริ่มที่อัตรา ๕ หยดต่อนาที โดยปรับปริมาณการให้สารน้ำตามการหดรัดตัวของมดลูก ติดเครื่องบันทึกอัตรา การเต้นของหัวใจทารกในครรภ์ เพื่อเฝ้าระวังภาวะหัวใจทารกในครรภ์ผิดปกติ (Fetal distress) และบันทึก การหดรัดตัวของมดลูกทุก ๓๐ นาที เพื่อเฝ้าระวังการหดรัดตัวของมดลูกมากกว่าปกติ (Hypertonic Uterine contractions)

คลอดปกติเวลา ๑๙.๕๕ นาฬิกา ทารกเพศหญิง น้ำหนัก ๓,๓๒๐ กรัม APGAR Score นาทีที่ ๑ เท่ากับ ๙ คะแนน หักสี ๑ คะแนน นาทีที่ ๕ เท่ากับ ๑๐ คะแนน ทารกแข็งแรงดี ได้รับวิตามินเค (Vitamin K) ขนาด ๑ มิลลิกรัม เข้าทางกล้ามเนื้อหน้าขาด้านซ้าย ป้ายตาทั้ง ๒ ข้าง ด้วยเทอรามัยซิน อยอล์เมนท์ (Terramycin ointment) ผู้คลอดได้ยากระตุ้นการหดรัดตัวของมดลูก Syntocinon ปริมาณ ๑๐ ยูนิต ทางกล้ามเนื้อต้นแขนเพื่อให้มดลูกหดรัดตัวได้ดีป้องกันการตกเลือดหลังคลอด หลังจากการคลอดไฟล์หัว รถคลอดเวลา ๑๙.๒๗ นาฬิกา รถคลอดครบรักษณะปกติ มดลูกหดรัดตัวดี อัตราการเต้นของหัวใจ ๘๖ ครั้ง ต่อนาที อัตราการหายใจ ๒๐ ครั้งต่อนาที ความดันเลือด ๑๖๐/๑๐ มิลลิเมตรปอร์ท ดูแลกระเพาะปัสสาวะ ให้ว่างโดยการสวนปัสสาวะทิ้ง ดูแลเย็บซ่อมแซมแผลฝีเย็บ กระตุ้นการดาดฟันมดลูก หลังเย็บแผลผู้คลอดเสีย เลือดจากการคลอดโดยรวมประมาณ ๒๕๐ มิลลิลิตร ให้การดูแลหลังคลอด ๒ ชั่วโมง โดยบันทึกสัญญาณชีพ ทุก ๓๐ นาที เป็นเวลา ๑ ชั่วโมง กระตุ้นให้หารกดูดนมารดาเพื่อสร้างสัมพันธภาพระหว่างมารดาและทารก ผู้คลอดมดลูกหดรัดตัวดี แผลฝีเย็บไม่บวม ไม่มีเลือดคั่ง อุณหภูมิร่างกาย ๓๗.๓ องศาเซลเซียส อัตราการเต้นของหัวใจ ๘๕ ครั้งต่อนาที อัตราการหายใจ ๑๘ ครั้งต่อนาที ทารกอุณหภูมิร่างกาย ๓๗.๓ องศาเซลเซียส อัตราการเต้นของหัวใจ ๑๕๕ ครั้งต่อนาที อัตราการหายใจ ๕๕ ครั้งต่อนาที ย้ายหอผู้ป่วยหลังคลอดและเด็ก Mara ดาวหลังคลอดไม่พบอาการติดเชื้อ มดลูกหดรัดตัวดี แผลฝีเย็บไม่มีเลือดออก ไม่บวม ไม่มีเลือดคลั่ง น้ำนม ไหลดี ทารกสุขภาพแข็งแรง ดูดนมได้ดี มารดาและทารกได้รับการวางแผนการจำหน่ายและปฏิบัติตัวต่อที่บ้าน อย่างเหมาะสม รวมระยะเวลาที่พักรักษาตัวในโรงพยาบาล ๕ วัน

#### ประโยชน์ที่ได้รับ

๑. ผู้คลอดได้รับการดูแลอย่างมีมาตรฐานเมื่อมีภาวะถุงน้ำคั่งร้าบต่อก่อนการเจ็บครรภ์และได้รับยากระตุ้นการหดรัดตัวของมดลูก
๒. ผู้คลอดได้รับการวินิจฉัย การดูแลรักษาที่รวดเร็วและปลอดภัย
๓. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  
ชื่อข้อเสนอ แนวทางการบริหารยาสำหรับพยาบาลห้องคลอด  
วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย
  ๑. เพื่อลดอุบัติการณ์ความคลาดเคลื่อนทางยา
  ๒. เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันความคลาดเคลื่อนทางยา และเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์  
ในการบริหารยาสำหรับพยาบาลห้องคลอด
  ๓. บุคลากรทางการพยาบาลมีความพึงพอใจต่อแนวทางการบริหารยา
- ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
  ๑. ผู้คลอดได้รับความปลอดภัยจากการบริหารยา
  ๒. ลดอัตราการเกิดความคลาดเคลื่อนทางยาและเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากยาน้อยกว่าร้อยละ ๕
  ๓. เพิ่มอัตราการบันทึกการติดตามการใช้ยาความเสี่ยงสูงมากกว่าร้อยละ ๘๐
  ๔. พยาบาลห้องคลอดทราบหนักถึงความสำคัญของการบริหารยา และสามารถปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดได้ถูกต้อง