



ประกาศสำนักการแพทย์
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ อนุมัติ
หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลและการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ
ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้นำ
หลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป)
และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ สำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่
๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ซึ่งได้กำหนดให้หน่วยงานพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้
ดำรงตำแหน่งตามที่ ก.ก. ได้กำหนดตำแหน่งไว้แล้วในอัตราส่วน ๑ ราย ต่อ ๑ ตำแหน่ง มาใช้กับการประเมินบุคคล
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ

สำนักการแพทย์ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก
พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นแล้ว ปรากฏว่า
มีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับ ^{การคัดเลือก} (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ
๑	นางสาวอมรรัตน์ ธงเสนเมือง	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพต. ๒๘๙)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพต. ๒๘๙)	ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลตากสิน สำนักการแพทย์
๒	นางสาวแก้วกาญจน์ โภมากุล ณ นคร	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพต. ๔๕๗)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพต. ๔๕๗)	ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลตากสิน สำนักการแพทย์

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔

(นายชูวิทย์ ประดิษฐบุฑุกา)
รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์
ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการแพทย์

สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นางสาวอมรรัตน์ รงเสนเมือง

เพื่อประเมินบุคคลในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพด. ๒๘๙)

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
๑. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล	
๑.๑. คุณวุฒิการศึกษา	- พยาบาลศาสตรบัณฑิต
๑.๒. ประวัติการรับราชการ	- อายุราชการ ๕ ปี (ตั้งแต่วันที่ ๑ มิ.ย. ๒๕๕๐ ถึงวันที่ ๓๑ พ.ค. ๒๕๕๙)
๑.๓. มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือได้รับการยกเว้นจาก ก.ก.แล้ว	- ดำรงตำแหน่งระดับ ๕ หรือเทียบเท่าเป็นเวลา ๕ ปี (ตั้งแต่วันที่ ๑ มิ.ย. ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๓๑ พ.ค. ๒๕๕๙)
๑.๔. มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะคัดเลือก	- ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการหรือเทียบเท่าเป็นเวลา ๕ ปี (ตั้งแต่วันที่ ๑ มิ.ย. ๒๕๕๐ ถึงวันที่ ๓๑ พ.ค. ๒๕๕๙)
๑.๕. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)	- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ขั้นหนึ่งใบอนุญาตที่ ๔๗๑๑๙๕๒๐๙
๒. การพิจารณาคุณลักษณะของบุคคล	
- ต้องได้รับคะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชาประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	- ได้คะแนนประเมิน ร้อยละ.....๘๘.....
๓. อื่น(ระบุ)	

เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางสาวอมรรัตน์ รงเสนเมือง

ตำแหน่งที่จะขอรับการประเมิน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพศ. ๒๘๙)

๑. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน การพยายามผู้ป่วยภาวะเลือดออกในช่องคลอด

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน ๕ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ – ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗)

ขณะดำเนินการตามแผนพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลตากสิน สำนักการแพทย์

กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด

กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคน รายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน

ผลสำเร็จของงาน (ระบุความสำเร็จเป็นผลผลิต หรือผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับ)

จากการณีศึกษาผู้ป่วยชายไทยอายุ ๓๒ ปี เลขที่ภายนอก ๒๑๐๓๑/๕๗ เลขที่ภายใน ๙๕๒๘/๕๗ อาการสำคัญที่มาโรงพยาบาลคือ ผู้ป่วยมีอาการตาชาวน้ำ ปวดตามาก ประมาณ ๓ ชั่วโมงก่อนมาโรงพยาบาล โรคพยาบาล เกิดอุบัติเหตุจากไม้เบดมินตันกระแทกตาข้างขวาขณะออกกำลังกาย มีอาการปวดตา ตาชาแรงมาก ตามัวมองเห็นเป็นภาพสีดำๆ น้ำตาไหลตลอด มาตรวจที่ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน แพทย์ตรวจรักษา ส่งปรึกษาแพทย์เฉพาะทางตา วินิจฉัยผลการตรวจ น่าจะเป็นภาวะเลือดออกในช่องลูกตา ให้รับไว้รักษาตัวในโรงพยาบาลที่ห้องผู้ป่วยตา ชุด คอ จมูก เพื่อให้นอนพักอยู่บ้านเตียง (Absolute bed rest) และให้การรักษาโดยการหยุดตาก ในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. แรกรับผู้ป่วยรู้สึกตัวดี ประเมินอาการ ปวดตามาก ปวดศีรษะมาก พบร่วงดับคคะแนนความปวด (Pain scale) ได้ ๔ คะแนน ตามัวมองเห็นเป็นภาพสีดำๆ การพยาบาล ดูแลให้รับประทานยาแก้ปวดพาราเซตามอล ๕๐๐ มิลลิกรัม (paracetamol ๕๐๐ mg) ๒ เม็ด และวางประคบเย็นเพื่อบรรเทาอาการปวดตา หลังรับประทานยาแก้ปวด ระดับคคะแนนความปวด (Pain scale) ได้ ๔ คะแนน นอนหลับได้ สัญญาณชีพอุณหภูมิร่างกาย ๓๗ องศาเซลเซียส ความดันโลหิต ๑๓๖/๘๒ มิลลิเมตร汞 ปกติ วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. แพทย์เฉพาะทางตา ตรวจเยี่ยมอาการ วัดระดับสายตา (Visual Acuity) Right eye ๒๐/๒๐ cornea clear ประเมินผู้ป่วยมีภาวะเลือดออกในช่องลูกตา พบร่วงผู้ป่วยมีเยื่อบุตาแดงเล็กน้อย ตาชาแรง มีขนาดเลือดออกในช่องลูกตาประมาณ ๑/๒ มิลลิเมตร การพยาบาลให้พักรักษาอยู่บ้านเตียงให้ยา Flarex eye drop หยดตาขาว เวลาเข้า กลางวัน เย็น ก่อนนอนผู้ป่วยไม่มีเลือดออกในช่องลูกตาเพิ่มขึ้นหรือซึมออก การมองเห็นมัวมองไม่ชัดเป็นภาพจุดดำ วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. แพทย์เฉพาะทางตา ตรวจเยี่ยมอาการ วัดระดับสายตา Right eye ๒๐/๒๐ cornea clear ประเมินผู้ป่วยมีภาวะเลือดออกในช่องลูกตา พบร่วงผู้ป่วยมีเยื่อบุตาแดงเล็กน้อย ตาชาแรง มีขนาดเลือดออกในช่องลูกตาเล็กน้อย ไม่ปวดตาระดับคคะแนนความปวด (Painscale) ได้ ๒ คะแนนการพยาบาล ให้พักรักษาอยู่บ้านเตียงให้ยา Flarex eye drop หยดตาขาว เวลาเข้า กลางวัน เย็น ก่อนนอน ซึ่งผู้ขอรับการประเมินได้ให้การพยาบาลผู้ป่วยภาวะเลือดออกในช่องลูกตาในความดูแล ๒ วัน และได้เยี่ยมผู้ป่วยทั้งหมด ๒ ครั้ง ระหว่างรับผู้ป่วยไว้ในความดูแลพบว่าผู้ป่วยมีปัญหาทางการพยาบาล ๒ ปัญหา ซึ่งปัญหาทั้งหมดได้รับการแก้ไขหมดไป แพทย์ตรวจเยี่ยมอาการอนุญาตให้กลับบ้านได้ ประเมินอาการผู้ป่วยก่อนกลับบ้านผู้ป่วยรู้สึกตัวดีช่วยเหลือตัวเองได้ตามของเห็นภาพจำเล็กน้อยตามัวลดลงมีภาวะเลือดออกในช่องลูกตาลดลงมาก สีหน้าสดชื่น ยิ้มแย้ม ผู้ป่วยมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลตนเองเรื่องการสังเกตอาการผิดปกติ ให้คำแนะนำทำการปฏิบัติตัวขณะอยู่บ้านแก่ผู้ป่วย เช่น การรับประทานยาต่อเนื่องและการพักผ่อน แนะนำการหยุดตากเมื่อกลับบ้านให้หยุดตรงตามเวลา เพื่อป้องกันกระตุนเลือดออกและสังเกตอาการผิดปกติ ที่ควรกลับมาพบแพทย์ เช่น มีอาการปวดตา ปวดศีรษะมากแนะนำให้มาตรวจก่อนวันนัดได้ นัดมาตรวจเพื่อดูตามผลการรักษา วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. ที่ห้องตรวจจักษุรังษีเวลาในการรักษาตัวในโรงพยาบาล ๔ วัน

๒. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ชื่อข้อเสนอ นวัตกรรม อุปกรณ์ครอบหัวอดยาข่ายม่านตา
วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย
๑. เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการหยุดยาข่ายม่านตาอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
 ๒. เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากยาข่ายม่านตาให้เหลือขั้นไปยังตาซึ่งที่ไม่ได้เตรียมผ่าตัด
 ๓. เพื่ออำนวยความสะดวกในการหยุดยาข่ายม่านตา
- ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
๑. ผู้ป่วยได้รับการหยุดยาข่ายม่านตาถูกวิธี ครบถ้วน เนพาะตาซึ่งที่จะทำผ่าตัด
 ๒. ไม่พบความเสี่ยงและป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากยาข่ายม่านตาอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพทุกราย
 ๓. ผู้ป่วยได้รับความสะดวก รวดเร็วในรายที่เตรียมผ่าตัดฉุกเฉิน