



ประกาศสำนักการแพทย์
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ อนุมัติ
หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลและการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ
ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้นำ
หลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป)
และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ สำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่
๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ซึ่งได้กำหนดให้หน่วยงานพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้
ดำรงตำแหน่งตามที่ ก.ก. ได้กำหนดตำแหน่งไว้แล้วในอัตราร่วม ๑ ราย ต่อ ๑ ตำแหน่ง มาใช้กับการประเมินบุคคล
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ

สำนักการแพทย์ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก
พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นแล้ว ปรากฏว่า
มีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับ การคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ/ หน่วยงาน
๑	นางสาวพีรวาร์ พฤกษ์ดิ	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๓๙๖)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๓๙๖)	ฝ่ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์

ประกาศ ณ วันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นางสาวสุภาพร กรณ์กานต์)

รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์
ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการแพทย์

สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นางสาวพิรภาร์ พฤกษีดา
เพื่อประเมินบุคคลในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๓๙๖)

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
๑. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล	
๑.๑ คุณวุฒิการศึกษา	- พยาบาลศาสตรบัณฑิต
๑.๒ ประวัติการรับราชการ	- อายุราชการ ๑๐ ปี ๑๐ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ก.ค. ๒๕๕๑ ถึงวันที่ ๑๒ มิ.ย. ๒๕๖๒)
๑.๓ มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือได้รับการยกเว้นจาก ก.ก.แล้ว	- ดำรงตำแหน่งระดับปฏิบัติการ เป็นเวลา ๗ ปี ๙ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ส.ค. ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๑๒ มิ.ย. ๒๕๖๒)
๑.๔ มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะคัดเลือก	- ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ เป็นเวลา ๑๐ ปี ๑๐ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ก.ค. ๒๕๕๑ ถึงวันที่ ๑๒ มิ.ย. ๒๕๖๒)
๑.๕ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ	- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ขั้นหนึ่ง ใบอนุญาตที่ ๔๘๑๗๐๙๖๑
๒. การพิจารณาคุณลักษณะของบุคคล	
- ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชาประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	- ได้คะแนนประเมิน ร้อยละ ๙๓
๓. อื่น ๆ (ระบุ).....

เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางสาวพีรภาร์ พฤกษ์ดิชา

ตำแหน่งที่จะขอรับการประเมิน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๓๙๖)

๑. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน การพยาบาลผู้ป่วยหอบหืดเฉียบพลัน

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน ๓ วัน (วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐)

ขณะดำเนินการทำหน้าที่พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ฝ่ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล

โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์

กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด

กรณีดำเนินการร่วมกับแพทย์คน รายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน

ผลสำเร็จของงาน (ระบุความสำเร็จเป็นผลผลิต หรือผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับ)

กรณีศึกษาผู้ป่วยหญิงไทยอายุ ๓๓ ปี สัญชาติไทย HN ๓๔๗๓๓/๖๐ AN ๑๖๕๓/๖๐ มีโรคประจำตัวคือ โรคหอบหืดมา ๓ ปี เข้ารับการตรวจที่โรงพยาบาลกรุงเทพมหานคร ด้วยอาการหายใจหอบเหนื่อยมาก ขึ้น ๓๐ นาทีก่อนมาโรงพยาบาล ให้การรักษาอาการไม่ทุเลา จึงส่งต่อโรงพยาบาลสิรินธรตามสิทธิการรักษา แรกรับที่หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๐๐ น. ผู้ป่วยรู้สึกตัวดี มีอาการหอบเหนื่อย อ่อนเพลีย ไอเสียงสีขาวซุ่ม ฟังเสียงปอดมีเสียง wheezing ขณะหายใจเข้าออกหั้งสองข้าง ช่วยเหลือตัวเองได้บ่น เตียง สัญญาณชีพ อุณหภูมิ ๓๖.๗ องศาเซลเซียส ชีพจร ๑๒๐ ครั้งต่อนาที หายใจ ๓๐ ครั้งต่อนาที ความดันโลหิต ๑๑๔/๗๘ มิลลิเมตรปอร์ท ค่าความอิ่มตัวออกซิเจนในเลือดส่วนปลาย ร้อยละ ๙๕ ตูดเก็ทผู้ป่วยหายใจผ่าน ออกซิเจน cannula ๕ ลิตรต่อนาที จัดท่านอนศีรษะสูง พ่นยาขยายหลอดลม Berodual ๑ nebulizer ทุก ๖ ชั่วโมง ให้ยา Dexamethasone ๕ mg ทางหลอดเลือดดำทุก ๖ ชั่วโมง และให้ยา Meptin mini รับประทาน ครั้งละ ๑ เม็ดหลังอาหารเข้า เย็น เผ้าติดตามอาการข้างเคียงของยา เช่น ใจสั่นชีพจรเต้นเร็ว หลังพ่นยา หายใจหอบเหนื่อย ลดลง ภาพถ่ายรังสีทรวงอกมีลักษณะเป็นฝ้าขาวที่ปอดทั้งสองข้าง (Interstitial thickening at both lung) แผนการรักษาให้ยาปฏิชีวนะ Ceftriaxone ๒ գ. ทางหลอดเลือดดำ และ Clarithromycin ขนาด ๒๕๐ มิลลิกรัม รับประทาน ครั้งละ ๒ เม็ด ก่อนอาหารเข้า ผู้ป่วยไม่มีไข้ ยังมีอาการไอ มีเสมหะ แผนการรักษาดูแลให้ยา Bisolvon รับประทาน ครั้งละ ๑ เม็ด หลังอาหารเข้า กลางวัน เย็นและให้ยา Ceterizine รับประทานครั้งละ ๑ เม็ดหลังอาหารเข้าแนะนำให้ดื่มน้ำอุ่นๆ สอนและกระตุนการไอ หลังได้รับยาผู้ป่วยโอลดลง เสมหะอ่อนนุ่ม ไอขับออกเองได้ เสมหะไม่เปลี่ยนสี ฟังเสียงปอดมี wheezing ลดลง แผนการรักษาให้ยา Seretide evohaler (๒๕/๑๒๕) ๑ puff ทุก ๑๒ ชั่วโมง แนะนำวิธีพ่นยา สอนสาธิตวิธีพ่นยาที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ พร้อมให้ปฏิบัติจริง ผู้ป่วยและญาติมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับการกำเริบช้ำของโรค ให้ข้อมูลเรื่องโรค อธิบายแผนการรักษา การปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันการกำเริบของโรค หลังพูดคุยและให้คำแนะนำผู้ป่วยและญาติสีหน้าสดชื่นขึ้น เข้าใจการดำเนินโรคและ การดูแลตัวเองมากขึ้น วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ ผู้ป่วยมีสีหน้าสดชื่นขึ้น หายใจเองสามารถอีกต่อไป ไอลดลง เสมหะลดลง ไม่เปลี่ยนสี ฟังเสียงปอดไม่มี wheezing หายใจเข้าและออกหั้งสองข้าง สัญญาณชีพ อุณหภูมิ ๓๖.๗ องศาเซลเซียส ชีพจร ๙๐ ครั้งต่อนาที อัตราการหายใจ ๒๐ ครั้งต่อนาที ความดันโลหิต ๑๑๐/๖๘ มิลลิเมตรปอร์ท แพทช์ตรวจเยี่ยมอาการอนุญาตให้กลับบ้านและให้ยกลับไปรับประทานต่อที่บ้านคือ Farmacef ๕๐๐ มิลลิกรัม รับประทานครั้งละ ๑ เม็ดวันละ ๒ เวลาหลังอาหารเข้า เย็น ยา Meptin mini รับประทานครั้งละ ๑ เม็ดวันละ ๓ เวลาหลังอาหารเข้า กลางวัน เย็น และ ยา Ceterizine รับประทานครั้งละ ๑ เม็ดวันละ ๑ ครั้งหลังอาหารเข้า ยาพ่น Seretide

evohaler ขนาด ๒๕/๑๒๕ ๑ puff สูดพ่นวันละ ๒ ครั้ง เช้า-เย็นให้คำแนะนำก่อนกลับบ้าน เรื่องการรับประทานยาตามแผนการรักษา รวมทั้งถูกต้องตามข้อความของยา และนำการใช้ยาขยายหลอดลมด้วยวิธีการสูดพ่นที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ หลังการพ่นยาบวนปากให้สะอาดเพื่อป้องกันการติดเชื้อในช่องปาก ทบทวนความรู้เรื่องโรค การดูแลตนเอง การปฏิบัติตนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอาการกำเริบ กรณีเกิดอาการหอบเหนื่อย หายใจลำบาก พ่นยาขยายหลอดลมแล้วไม่ดีขึ้น ให้มาพบแพทย์ทันที ผู้ป่วยพักรักษาตัวในโรงพยาบาลรวม ๓ วัน นัดมาตรวจนัดตามอาการอีกครั้งวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น โหรติดตามเยี่ยมอาการ ๒ ครั้ง ผู้ป่วยพ่นยาได้ดี ไม่มีอาการกำเริบ และมาตรวจตามนัด

**๒. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ซึ่งข้อเสนอ แนวทางปฏิบัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพ่นยาสำหรับผู้ป่วยโรคหอบหืด
วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย**

๑. เพื่อให้ผู้ป่วยมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่ถูกต้องในการพ่นยา
๒. เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถใช้ยาพ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓. เพื่อลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนและป้องกันการกลับเป็นซ้ำ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. ผู้ป่วยสามารถใช้ยาพ่นได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ลดการเกิดอาการกำเริบซ้ำ
๒. ลดอัตราการกลับมารักษาซ้ำด้วยอาการหอบหืดเฉียบพลันในผู้ป่วยโรคหอบหืด