

สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางสาวสุรีย์พร สมัย
เพื่อประเมินบุคคลในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพต. ๒๐๗)

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
<p>๑. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล</p> <p>๑.๑ คุณวุฒิการศึกษา</p> <p>๑.๒ ประวัติการรับราชการ</p> <p>๑.๓ มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือได้รับยกเว้นจาก ก.ก. แล้ว</p> <p>๑.๔ มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสางานที่จะคัดเลือก</p> <p>๑.๕ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)</p>	<p>- พยาบาลศาสตรบัณฑิต</p> <p>- อายุราชการ ๖ ปี ๒ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๒๑ พ.ค. ๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๕ ส.ค. ๒๕๕๘)</p> <p>- ดำรงตำแหน่ง ระดับ๔ หรือเทียบเท่า เป็นเวลา ๔ ปี ๒ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๒๑ พ.ค. ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๕ ส.ค. ๒๕๕๘)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ หรือเทียบเท่า เป็นเวลา ๖ ปี ๒ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๒๑ พ.ค. ๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๕ ส.ค. ๒๕๕๘)</p> <p>- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ใบอนุญาตที่ ๕๒๑๑๒๐๙๙๑๒</p>
<p>๒. การพิจารณาคุณลักษณะของบุคคล</p> <p>- ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชาประเมิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐</p>	<p>- ได้คะแนนประเมินร้อยละ ๘๘</p>
<p>๓. อื่น ๆ (ระบุ)</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	

เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางสาวสุรีย์พร สมัย

เพื่อประเมินบุคคลในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพต. ๒๐๗)

๑. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะเลือดออกในระบบทางเดินอาหารส่วนบน

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน ๓ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๖)

ขณะดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สังกัดฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลตากสิน สำนักการแพทย์

กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด

กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคน รายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน
ผลสำเร็จของงาน (ระบุความสำเร็จเป็นผลผลิต หรือผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับ)

ผู้ป่วยชายไทย อายุ ๖๑ ปี เข้ารับการรักษาที่หอบำบัดผู้ป่วยหนัก เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๖ ด้วยอาการถ่ายอุจจาระเป็นมูกเลือดสีดำ มีอาการอ่อนเพลีย ๓ วัน ก่อนมาโรงพยาบาล ปฏิเสธการดื่มสุราและสูบบุหรี่ ประวัติการเจ็บป่วยปัจจุบัน ๑ สัปดาห์ก่อนมาโรงพยาบาล ผู้ป่วยมีอาการถ่ายอุจจาระเป็นน้ำเหลวปนเลือดสีดำ ประมาณ ๓-๔ ครั้ง มีกลิ่นเหม็น รับประทานอาหารได้น้อย ญาติจึงซื้อยามีลักษณะเป็นเม็ดแคปซูลมาให้ผู้ป่วยรับประทาน ๔ เม็ดต่อวัน รับประทานไปประมาณ ๓ วัน อาการไม่ดีขึ้น มีอาการอ่อนเพลีย ซึมลง ญาติจึงนำส่งสถานพยาบาล รัชดา-ท่าพระ ถึงสถานพยาบาลผู้ป่วยหัวใจหอบลึก ๓๔ ครั้ง/นาที แพทย์พิจารณาใส่ท่อช่วยหายใจทางปาก ใส่สายยางทางจมูกถึงกระเพาะอาหารสวนล้างกระเพาะอาหาร มีเลือดจางๆต่อลงลงระบาย แพทย์วินิจฉัยว่ามีภาวะเลือดออกในทางเดินอาหารส่วนบนจึงนำส่งโรงพยาบาลตากสินตามสิทธิการรักษา แกรับมาจากสถานพยาบาล รัชดา-ท่าพระส่งถึงหอบำบัดผู้ป่วยหนักอายุรกรรม ผู้ป่วยเรียกไม่รู้สีกตัว ประเมินสัญญาณชีพ ผู้ป่วยหายใจ ๓๐ ครั้ง/นาที อัตราการเต้นของหัวใจ ๑๒๔ ครั้ง/นาที พบความดันโลหิตต่ำกว่าปกติ ๗๔/๓๖ มิลลิเมตรปรอทผู้ป่วยมีภาวะช็อค ให้ยาเพิ่มความดัน Dopamine(๒:๑) หยดทางหลอดเลือดดำปรับอัตราการไหลตามความดันโลหิต และให้สารน้ำ ๐.๙% NSS ๑,๐๐๐ ซีซีทางหลอดเลือดดำอัตราการไหล ๑๐๐ ซีซีต่อชั่วโมงตามแผนการรักษา พร้อมสังเกตอาการและติดตามประเมินสัญญาณชีพอย่างใกล้ชิด ทุก ๑ ชั่วโมง ผู้ป่วยมีอาการดีขึ้น ความดันโลหิตปกติ ๑๑๐/๕๘ มิลลิเมตรปรอท แต่พบเลือดจางๆออกมาทางถูระบายจากกระเพาะอาหาร ผู้ป่วยยังมีภาวะเลือดออกในทางเดินอาหาร ให้งดน้ำงดอาหาร ให้ยา Omeprazole ๔๐ มิลลิกรัมฉีดทางหลอดเลือดดำทุก ๑๒ ชั่วโมงตามแผนการรักษา ติดตามผลความเข้มข้นของเลือดปลายนิ้วทุก ๖ ชั่วโมง ค่าความเข้มข้นของเม็ดเลือดแดงปกติ รวมทั้งสังเกตอาการอาเจียนเป็นเลือด อาการถ่ายอุจจาระสีดำหรือมีเลือดปน สังเกตสีของน้ำย่อยในกระเพาะอาหารที่ออกมาทางถูระบายมีลักษณะเป็นสีเขียวใส ไม่มีอาการถ่ายดำหรือถ่ายอุจจาระมีเลือดปน วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ ผู้ป่วยมีอาการชักเกร็งติดตามผลแคลเซียมและแมกนีเซียมในเลือด พบค่าแมกนีเซียมในเลือดต่ำ ๐.๗ มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร ได้รับ ๕๐% MgSO_๔ ๔ ซีซีผสม ๐.๙% NSS ๑๐๐ ซีซี หยดทางหลอดเลือดดำในเวลา ๔ ชั่วโมง สังเกตไม่มีบวม แดงบริเวณที่ให้นยาและได้รับยากันชัก phenytoin ๑๐๐ มิลลิกรัมหยดทางหลอดเลือดดำทุก ๘ ชั่วโมง ติดตามประเมินและบันทึกสัญญาณชีพของผู้ป่วยทุก ๑ ชั่วโมงสัญญาณชีพปกติเฝ้าระวังภาวะชักไม่พบว่ามีชักเกร็ง บันทึกสารน้ำเข้าออกจากร่างกายของผู้ป่วยสมดุลดี เฝ้าติดตามผลความเข้มข้นของเลือดปลายนิ้วทุก ๘ ชั่วโมงตามแผนการรักษา พบว่ามีภาวะช็อค ความเข้มข้นของเม็ดเลือดแดง ๒๗.๙ ให้เม็ดเลือดแดงอัดแข็ง ๑ ถูตามแผนการรักษาติดตามสังเกตและเฝ้าระวังอาการแพ้เลือด ส่งผู้ป่วยนัดส่งกล้องทางเดินอาหาร

นอกจากนี้พยาบาลได้ซักประวัติเพิ่มเติมว่า ผู้ป่วยรับประทานอาหารได้มีอิสระ ๒-๓ คำ เมื่อมีอาการเจ็บป่วยผู้ป่วยมักซื้อยามารับประทานเอง พยาบาลให้ญาตินำยามาให้ดู พบว่ามียาแก้ปวดเป็นยาชุดด้วย สาเหตุที่เลือดออกในกระเพาะอาหารในผู้ป่วยรายนี้คือรับประทานอาหารไม่ตรงเวลาและซื้อยาแก้ปวดมารับประทานเอง อธิบายสาเหตุที่มีเลือดออกในทางเดินอาหารส่วนบนแก่ผู้ป่วยและญาติได้รับทราบและสามารถสังเกตอาการภาวะเลือดออกในทางเดินอาหารได้ แนะนำให้ผู้ป่วยรับประทานอาหารให้ตรงเวลา งดรับประทานอาหารรสจัด รับประทานเฉพาะอาหารอ่อนและย่อยง่าย รวมทั้งไม่ซื้อยารับประทานเอง ผู้ป่วยได้รับอนุญาตให้กลับบ้าน วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ นัดพบแพทย์ วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖

ประโยชน์ที่ได้รับ

๑. พยาบาลมีความรู้ความสามารถในการดูแลผู้ป่วยภาวะเลือดออกในทางเดินอาหาร เรื่องการเตรียมตัวก่อนตรวจส่องกล้องและหลังส่องกล้องในทางเดินอาหาร
 ๒. พยาบาลมีความรู้ความสามารถในการให้การพยาบาลผู้ป่วยในภาวะช็อกและการเฝ้าระวังการเกิดอุบัติเหตุขณะช็อก
๒. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
 ข้อเสนอ เเบาะรองจากถุงน้ำยาล้างไตเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันการเกิดแผลกดทับ
 วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย
 เพื่อลดอัตราการเกิดแผลกดทับในผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้หลังกลับบ้าน

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. ป้องกันและลดอุบัติการณ์การเกิดแผลกดทับในผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้หลังกลับบ้าน
๒. เป็นแนวทางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลผู้ป่วยรวมทั้งเพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ป่วย
๓. ประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อที่นอนลมไฟฟ้า