



ประกาศสำนักการแพทย์
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ อนุมัติ
หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลและการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ
ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้นำ
หลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป)
และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ สำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่
๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ซึ่งได้กำหนดให้หน่วยงานพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้
ดำรงตำแหน่งตามที่ ก.ก. ได้กำหนดตำแหน่งไว้แล้วในอัตราส่วน ๑ ราย ต่อ ๑ ตำแหน่ง มาใช้กับการประเมินบุคคล
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ

สำนักการแพทย์ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก
พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นแล้ว ปรากฏว่า
มีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับ การคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ/ หน่วยงาน
๑	นางสาวพีรวาร พฤกษีดา	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๔๘๓)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๔๘๓)	ฝ่ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์

ประกาศ ณ วันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

(นางสาวสุภาวดี กรลักษณ์)
รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์
ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการแพทย์

สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นางสาวพิรภาร์ พฤกษีดา

เพื่อประเมินบุคคลในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๔๘๓)

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
๑. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล	
๑.๑ คุณวุฒิการศึกษา	- พยาบาลศาสตรบัณฑิต
๑.๒ ประวัติการรับราชการ	- อายุราชการ ๙ ปี ๖ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ก.ค. ๒๕๕๑ ถึงวันที่ ๙ ก.พ. ๒๕๖๑)
๑.๓ มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและ การปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐาน กำหนดตำแหน่งหรือได้รับการยกเว้น จาก ก.ก. แล้ว	- ดำรงตำแหน่งระดับปฏิบัติการ เป็นเวลา ๖ ปี ๕ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ส.ค. ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๙ ก.พ. ๒๕๖๑)
๑.๔ มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือ เคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะคัดเลือก	- ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ เป็นเวลา ๙ ปี ๖ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ก.ค. ๒๕๕๑ ถึงวันที่ ๙ ก.พ. ๒๕๖๑)
๑.๕ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)	- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ การผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ใบอนุญาตที่ ๔๔๑๗๐๙๖๑
๒. การพิจารณาคุณลักษณะของบุคคล	
ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชาประเมิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	- ได้คะแนนประเมิน ร้อยละ ๙๕
๓. อื่นๆ (ระบุ).....

เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางสาวพิรภาร์ พฤกษีดา

ตำแหน่งที่จะขอรับการประเมิน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๔๘๓)

๑. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน การพยาบาลผู้ป่วยหอบหืดเฉียบพลัน

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน ๓ วัน (วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐)

ขณะดำเนินการทำหน้าที่พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ฝ่ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล

โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์

กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด

กรณีดำเนินการร่วมกับแพทย์คน รายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน ผลสำเร็จของงาน (ระบุความสำเร็จเป็นผลผลิต หรือผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับ)

กรณีศึกษาผู้ป่วยหญิงไทยอายุ ๓๓ ปี สัญชาติไทย HN ๓๕๗๓๓/๖๐ AN ๑๙๕๓๔/๖๐ มีโรคประจำตัวคือ โรคหอบหืดมา ๓ ปี เข้ารับการตรวจที่โรงพยาบาลกรุงเทพมหานคร ด้วยอาการหายใจหอบเหนื่อยมาก ขึ้น ๓๐ นาทีก่อนมาโรงพยาบาล ให้การรักษาอาการไม่ทุเลา จึงส่งต่อโรงพยาบาลสิรินธรตามสิทธิการรักษา แรกรับที่หอบผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๒.๐๐ น. ผู้ป่วยรู้สึกตัวดี มีอาการหอบเหนื่อย อ่อนเพลีย ไอมีเสmen แห้งสีขาวซุน พิงเสียงปอดมีเสียง wheezing ขณะหายใจเข้าและหายใจออกทั้งสองข้าง ช่วยเหลือตัวเองได้บันเดียง สัญญาณชีพ อุณหภูมิ ๓๖.๗ องศาเซลเซียส ชีพจร ๑๒๐ ครั้งต่อนาที อัตราการหายใจ ๓๐ ครั้งต่อนาที ความดันโลหิต ๑๑๔/๗๘ มิลลิเมตรปรอท ค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดส่วนปลายร้อยละ ๘๕ ดูแลให้ผู้ป่วยหายใจผ่านออกซิเจน cannula ๕ ลิตร/นาที จัดท่านอนศีรษะสูง พ่นยาขยายหลอดลม Berodual ๑ nebulizer ทุก ๖ ชม. ให้ยา Dexamethasone ๔ mg. ทางหลอดเลือดดำทุก ๖ ชม. และให้ยา Meptin mini รับประทาน ครั้งละ ๑ เม็ด หลังอาหารเช้า เย็น เผาติดตามอาการข้างเคียงของยา เช่น ใจสั่น ชีพจรเต้นเร็ว หลังพ่นยาผู้ป่วยหายใจหอบเหนื่อยลดลง ภาพถ่ายรังสีทรวงอกมีลักษณะเป็นฝ้าขาวที่ปอดทั้งสองข้าง (Interstitial thickening at both lung) แผนการรักษาให้ยาปฏิชีวนะ Ceftriaxone ๒ กรัม. ทางหลอดเลือดดำ และ Clarithromycin ขนาด ๒๕๐ มิลลิกรัมรับประทาน ครั้งละ ๒ เม็ด ก่อนอาหารเช้า ผู้ป่วยไม่มีไข้ ยังมีอาการไอ มีเสมหะ แผนการรักษาดูแลให้ยา Bisolvon รับประทาน ครั้งละ ๑ เม็ดหลังอาหารเช้า กลางวัน เย็น และให้ยา Ceterizine รับประทานครั้งละ ๑ เม็ดหลังอาหารเช้า แนะนำให้ดื่มน้ำอุ่นๆ สอนและการต้นการไอ หลังได้รับยาผู้ป่วยไอลดลง เสมหะอ่อนนุ่ม ไอขับออกเองได้ เสมหะไม่เปลี่ยนสี พิงเสียงปอดมีเสียง wheezing ลดลง แผนการรักษาให้ยา Seretide evohaler (๔๕/๑๖๕) ๑ puff ทุก ๑๒ ชั่วโมง แนะนำวิธีการพ่นยา สอนสาอิทวิธิพ่นยาที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งให้ผู้ป่วยปฏิบัติจริง ผู้ป่วยและญาติมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับการทำเรียบช้าของโรค ให้ข้อมูลเรื่องโรค อธิบายแผนการรักษา การปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันการทำเรียบท่อง หลังพูดคุยและให้คำแนะนำผู้ป่วยและญาติสีหน้าสดชื่นขึ้น เข้าใจการดำเนินโรคและการดูแลตัวเองมากขึ้น วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ ผู้ป่วยมีสีหน้าสดชื่น หายใจลงสู่ม้าม่ำ หายใจลำบาก ไอลดลง เสมหะลดลง ไม่เปลี่ยนสี พิงเสียงปอดไม่มีเสียง wheezing ขณะหายใจเข้าและหายใจออกทั้งสองข้าง สัญญาณชีพ อุณหภูมิ ๓๖.๗ องศาเซลเซียส ชีพจร ๙๐ ครั้งต่อนาที อัตราการหายใจ ๒๐ ครั้งต่อนาที ความดันโลหิต ๑๑๐/๗๘ มิลลิเมตรปรอท ค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดส่วนปลายร้อยละ ๘๕-๘๗ สัญญาณชีพ แพทย์ตรวจเยี่ยมอาการอนุญาตให้กลับบ้านและให้ยากลับไปรับประทานต่อที่บ้านคือ Farmacef ๕๐๐ มิลลิกรัม รับประทานครั้งละ ๑ เม็ดวันละ ๒ เวลาหลังอาหารเช้า เย็น ยา Meptin mini รับประทานครั้งละ ๑ เม็ด วันละ ๒ เวลาหลังอาหารเช้า เย็น ยา Bisolvon รับประทาน

ครั้งละ ๑ เม็ดวันละ ๓ เวลาหลังอาหารเข้า กลางวัน เย็น ยา Ceterizine รับประทานครั้งละ ๑ เม็ด วันละ ๑ ครั้ง หลังอาหารเข้า และยาพ่น Seretide evohaler ขนาด (๒๕/๑๒๕) ๑ puff สูดพ่นวันละ ๒ ครั้ง เช้า เย็น ให้คำแนะนำก่อนกลับบ้าน เรื่องการรับประทานยาตามแผนการรักษา รวมทั้งถูกต้องซึ่งเดียงของยา ทบทวนการใช้ยา ขยายหลอดลมด้วยวิธีการสูดพ่นที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ หลังการพ่นยาบ้วนปากให้สะอาดทุกครั้ง ทบทวน ความรู้เรื่องโรค การดูแลตนเอง การปฏิบัติตามเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอาการกำเริบ กรณีเกิดอาการหอบเหนื่อย หายใจลำบาก พ่นยาขยายหลอดลมแล้วอาการไม่ดีขึ้น ให้รีบมาพบแพทย์ทันที ผู้ป่วยพกรักษาตัวในโรงพยาบาลรวม ๓ วัน นัดมาตรวจนัดตามอาการอีกครั้งวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น หลังผู้ป่วยกลับบ้านโทรศัพท์ตามเยี่ยม อาการ ๒ ครั้ง ผู้ป่วยพ่นยาได้ดี ไม่มีอาการกำเริบและมาตรวจนัด

๒. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานใหม่ประสิทธิภาพมากขึ้น

ชื่อข้อเสนอ แนวทางปฏิบัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพ่นยาสำหรับผู้ป่วยโรคหอบหืด วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย

๑. เพื่อให้ผู้ป่วยมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่ถูกต้องในการพ่นยา
 ๒. เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถใช้ยาพ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 ๓. เพื่อลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนและป้องกันการกลับเป็นซ้ำ
- ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
๑. ผู้ป่วยสามารถใช้ยาพ่นได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ลดการเกิดอาการกำเริบซ้ำ
 ๒. ลดอัตราการกลับมารักษาซ้ำด้วยอาการหอบหืดเฉียบพลันในผู้ป่วยโรคหอบหืด