



ประกาศกรุงเทพมหานคร
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ อนุมัติหลักเกณฑ์ การคัดเลือกบุคคลและการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้นำ หลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภท ทั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ สำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ซึ่งได้กำหนดให้กรุงเทพมหานครพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมิน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามที่ ก.ก. ได้กำหนดตำแหน่งไว้แล้วในอัตราส่วน ๑ ราย ต่อ ๑ ตำแหน่ง มาใช้กับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ

กรุงเทพมหานครได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก พร้อมทั้ง เค้าโครงเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่าน การคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับ การคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ/หน่วยงาน
๑.	นางสาวกิ่งกาญจน์ กาบเครือ	พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ (ด้านการพยาบาล วิสัยภูมิ) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๔๗๗)	พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล วิสัยภูมิ) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๔๗๗)	ฝ่ายการพยาบาล กลุ่มการกิจด้าน- การพยาบาล โรงพยาบาล เจริญกรุงประชาธิรักษ์ สำนักการแพทย์

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายกานต์พันธ์ ธรรมราษฎร์)
นายกกรุงเทพมหานคร

(เอกสารหมายเลข ๕)

สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นางสาวกิ่งกาญจน์ กับเครือ

เพื่อประเมินบุคคลในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาลวิสัญญี) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ.๕๑๗)

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
๑. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล	
๑.๑ คุณวุฒิการศึกษา	- พยาบาลศาสตรบัณฑิต
๑.๒ ประวัติการรับราชการ	- ประกาศนียบัตรวิสัญญีพยาบาล
๑.๓ มีระยะเวลาการทำงานทำงงานประจำใน การปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ใน มาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือได้รับการ ยกเว้นจาก ก.ก. แล้ว	- อาชญากรรม ๒๕๓๘ ถึงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐)
๑.๔ มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่ง หรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะ คัดเลือก	- ดำรงตำแหน่งสายงานพยาบาลวิชาชีพเป็นเวลา ๒๑ ปี ๔ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๓๙ ถึงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐)
๑.๕ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)	- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ การพดุงครรภ์ ขั้นหนึ่ง ใบอนุญาตที่ ๔๕๑๐๕๐๖๖๒
๒. การพิจารณาคุณลักษณะของบุคคล	- ได้คะแนนประเมิน ร้อยละ ๙๐..
- ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชา ประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	
๓. อื่นๆ	
(ระบุ)	

เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางสาวกิจกาญจน์ กับเครือ
 ตำแหน่งที่จะขอรับการประเมิน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาลวิสัญญี)
 (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๙๗๗)

๑. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิกเพื่อป้องกันภาวะความดันโลหิตต่ำในมารดา^{ผ่าตัดคลอดบุตรทางหน้าท้องที่ได้รับการระงับความรู้สึกเฉพาะส่วนโดยการฉีดยาชาเข้าช่องไขสันหลัง}

ช่วงระยะเวลาที่ทำงาน ๔ เดือน (ตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๕๘ – เมษายน ๒๕๕๘)

ขณะดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการ (ด้านการพยาบาลวิสัญญี) สังกัดฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเจริญกรุงประชาธิรักษ์ สำนักการแพทย์

กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด

กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคน รายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน

ผลสำเร็จของงาน (ระบุความสำเร็จเป็นผลผลิต หรือผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับ)

จากสถิติปี ๒๕๕๘ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชาธิรักษ์มีจำนวนมารดาคลอดบุตรทั้งหมด ๔,๓๗๔ ราย จำแนกเป็นมารดาที่เข้ารับการผ่าตัดคลอดบุตรทางหน้าท้อง จำนวน ๑,๓๗๘ ราย คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓๕ ซึ่งเป็นมารดาที่เข้ารับการผ่าตัดคลอดบุตรทางหน้าท้องที่ได้รับการระงับความรู้สึกเฉพาะส่วนโดยการฉีดยาชาเข้าช่องไขสันหลัง จำนวน ๑,๓๗๒ ราย มารดาที่เข้ารับการผ่าตัดคลอดบุตรทางหน้าท้องเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดภาวะความดันโลหิตต่ำหลังฉีดยาชาเข้าช่องไขสันหลัง อาจเป็นเพาะการผ่าตัดคลอดบุตรต้องการระดับการชาที่สูง (T๔) รวมทั้งขนาดดลูกที่ใหญ่เกิดทับเส้นเลือดดำให้ถูกขยันจนหงาย จากการทบทวนข้อมูลพบว่า มารดาที่เข้ารับการผ่าตัดคลอดบุตรทางหน้าท้องที่ได้รับการระงับความรู้สึกเฉพาะส่วนโดยการฉีดยาชาเข้าช่องไขสันหลังเกิดภาวะความดันโลหิตต่ำขณะรับการผ่าตัด จำนวน ๘๗๘ ราย คิดเป็นร้อยละ ๗๕ ภาวะความดัน-โลหิตต่ำหลังฉีดยาชาเข้าช่องไขสันหลังเป็นภาวะแทรกซ้อนที่พบมาก และมีความรุนแรงหากไม่ได้รับการแก้ไข จากการสังเกตการณ์การปฏิบัติการพยาบาลของพยาบาลวิสัญญีที่มีความหลากหลายแตกต่างกันตามประสบการณ์ พบว่า ยังไม่มีแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจน และเป็นมาตรฐานเพื่อป้องกันภาวะความดันโลหิตต่ำหลังฉีดยาชาเข้าช่องไขสันหลัง การปฏิบัติที่พบในปัจจุบัน คือ การให้สารน้ำชนิดที่แตกต่างกัน การให้ยาตีบหลอดเลือด การให้ออกซิเจน การประเมินค่าความดันโลหิตซีสโตลิกในขณะนั้นเบรียบเทียบกับค่าความดันโลหิตซีสโตลิกเดิมของผู้ป่วย ประกอบกับความความเร่งรีบในการให้บริการ ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจในการพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิกเพื่อป้องกันภาวะความดันโลหิตต่ำในมารดาผ่าตัดหลังคลอดบุตรทางหน้าท้องที่ได้รับการระงับความรู้สึกเฉพาะส่วนโดยการฉีดยาชาเข้าช่องไขสันหลัง เพื่อให้มารดาผ่าตัดคลอดบุตรทางหน้าท้องที่ได้รับการระงับความรู้สึกเฉพาะส่วนโดยการฉีดยาชาเข้าช่องไขสันหลังได้รับการป้องกันภาวะความดันโลหิตต่ำขณะผ่าตัดอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งมีแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนและมีมาตรฐาน เพื่อเพิ่มคุณภาพด้านการพยาบาล

ภายหลังดำเนินโครงการพบว่า พยาบาลวิสัญญี มีแนวทางการประเมินค่าความดันโลหิต ของมารดาผ่าตัดคลอดบุตรทุกรายอย่างต่อเนื่อง และมีการบันทึกข้อมูลไว้ในแบบบันทึกวิสัญญี

เป็นช่องทางสื่อสารกันในทีมสหสาขาวิชาชีพ มีแนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิกเพื่อป้องกันภาวะความดันโลหิตต่ำในการดาผ่าตัดคลอดบุตรทางหน้าท้องที่ได้รับการระงับความรู้สึกเฉพาะส่วนโดยการฉีดยาชาเข้าช่องไขสันหลัง เช่น การจัดทำให้ผู้ป่วยอนุเอยง ๔๕ องศา เพื่อป้องกันไม่ให้มดลูกกดทับบนหลอดเลือดดำใหญ่ การให้สารน้ำชนิด Isotonic crystalloid เข้าหลอดเลือดดำก่อนการฉีดยาเข้าช่องไขสันหลัง การพันขาด้วยผ้ายีด

จากการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิกดังกล่าวพบว่าการดาผ่าตัดคลอดบุตรทางหน้าท้องที่ได้รับการระงับความรู้สึกเฉพาะส่วนโดยการฉีดยาชาเข้าช่องไขสันหลังทุกรายได้รับการดูแลเพื่อป้องกันการเกิดภาวะความดันโลหิตต่ำหลังฉีดยาชาเข้าช่องไขสันหลังอย่างเหมาะสมสม เป็นมาตรฐานเดียวกัน จำนวนการเกิดภาวะความดันโลหิตต่ำหลังฉีดยาชาเข้าช่องไขสันหลังลดลงไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนจากภาวะความดันโลหิตต่ำ พยาบาลมีความพึงพอใจในการใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิก

๒. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ชื่อข้อเสนอ ผลการให้ดันตรีบำบัดต่อความวิตกกังวลขณะผ่าตัดของการดาผ่าตัดคลอดบุตรทางหน้าท้องที่ได้รับการระงับความรู้สึกเฉพาะส่วนโดยการฉีดยาชาเข้าช่องไขสันหลัง

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชาธิรักษ์
วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย

๑. เพื่อพัฒนารูปแบบการให้ดันตรีบำบัดในการลดความวิตกกังวลขณะผ่าตัดของการดาผ่าตัดคลอดบุตรทางหน้าท้องที่ได้รับการระงับความรู้สึกเฉพาะส่วนโดยการฉีดยาชาเข้าช่องไขสันหลัง

๒. เพื่อศึกษาความวิตกกังวลขณะผ่าตัดของการดาผ่าตัดคลอดบุตรทางหน้าท้องที่ได้รับการระงับความรู้สึกเฉพาะส่วนโดยการฉีดยาชาเข้าช่องไขสันหลัง

๓. เพื่อศึกษาผลการให้ดันตรีบำบัดในการลดความวิตกกังวลขณะผ่าตัดของการดาผ่าตัดคลอดบุตรทางหน้าท้องที่ได้รับการระงับความรู้สึกเฉพาะส่วนโดยการฉีดยาชาเข้าช่องไขสันหลัง

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. เป็นการพัฒนาแนวทางการลดความวิตกกังวลขณะผ่าตัดของการดาผ่าตัดคลอดบุตรทางหน้าท้องที่ได้รับการระงับความรู้สึกเฉพาะส่วนโดยการฉีดยาชาเข้าช่องไขสันหลังโดยการให้ดันตรีบำบัด

๒. มีรูปแบบและแนวทางการใช้ดันตรีบำบัดที่ถูกต้องและชัดเจนเพื่อลดระดับความวิตกกังวลขณะผ่าตัดในกลุ่มการดาผ่าตัดคลอดบุตรทางหน้าท้องที่ได้รับการระงับความรู้สึกเฉพาะส่วนโดยการฉีดยาชาเข้าช่องไขสันหลังและสามารถสร้างความพึงพอใจของ มาตรการดาผ่าตัดคลอดบุตรทางหน้าท้องและญาติได้